



# Cuidado, Bienestar y Formación

## Entrenando Hablador...

Tercer trimestre de 2025

Cuidado del ternero antes del destete

Este número de Training Talker es una contribución de Targeted Dairy Nutrition, Dr. Jim Tully, PhD, Dipl ACAN, Tully640@gmail.com  
"Los nutrientes adecuados para las vacas adecuadas en el momento adecuado"



Este número se centrará en el entorno del parto, la salud umbilical y el manejo adecuado de un ternero recién nacido. Cuando esto se combina con un manejo adecuado del calostro y la nutrición, puede ayudar a liberar el potencial genético de su futuro rebaño.

### Entorno de parto

#### Limpio y seco:

Las condiciones sanitarias son diferentes a las estériles. Considere las condiciones sanitarias como aquellas que no perjudican la salud. La esterilidad (como en los quirófanos) es una condición en la que las bacterias no pueden reproducirse. La limpieza rutinaria del área de parto, con cambios regulares de la cama, garantiza condiciones sanitarias para el parto.

#### Bien ventilado, pero sin corrientes de aire:

El aire de buena calidad reduce los problemas respiratorios, pero los terneros recién nacidos no deben estar expuestos a corrientes de aire. El ambiente debe tener una temperatura agradable tanto para los animales como para las personas.

#### Tranquilo y sin estrés:

El entorno de parto debe estar separado del rebaño principal y ser un área tranquila donde las vacas puedan sentirse seguras y el ruido y la actividad humana sean mínimos.

**1. Conozca los signos del parto • Etapa 1:**

Parto temprano (2 a 6 horas)

Signos: Inquietud, levantamiento de la cola, secreción de moco, aislamiento, contracciones leves.

Acción: Observar, pero no intervenir; preparar un área de parto limpia y seca. • Etapa 2: Trabajo de parto

activo (30 minutos – 2 horas)

Signos: La bolsa de agua se rompe, la vaca se recuesta y se esfuerza, aparecen las pezuñas del ternero .

Acción: Comience a cronometrar una vez que aparezcan las pezuñas. Si el progreso se detiene, esté listo

para ayudar. • Etapa 3: Expulsión de la placenta (en un plazo de 6 a 12 horas).

Acción: No intervenir a menos que se conserve durante 12 a 24 horas.

**2. Sigue la “Regla de los 30 minutos”**

Si no hay progreso 30 minutos después de que aparecen los cascos, evalúe y posiblemente ayude.

Ejemplo: No nace ningún ternero después de 30 minutos de pujos fuertes = es momento de verificar.

**3. Limpio, tranquilo y controlado Lávese bien las**

manos y los brazos; use guantes y lubricante limpio.

Mantenga a la vaca tranquila: evite el estrés, los ruidos fuertes o el manejo brusco.

Asegúrese de que esté en un área limpia, seca y no resbaladiza.

**4. Sepa cuándo ayudar**

Ayudar sólo si: No

hay progreso después de 30 minutos de esfuerzo intenso La

pantorrilla parece estar mal posicionada (por ejemplo, una pierna, la cabeza hacia atrás)

**El parto es prolongado (>2 horas sin ternero)**

La vaca está agotada o se esfuerza de manera ineficaz. 5.


**Llame a su veterinario si: Siente algo anormal**

(por ejemplo, útero torcido, ternero malformado)

No se puede reposicionar la pantorrilla

El parto ha durado demasiado tiempo sin que se produzca el parto (más de 3 horas en total)

**Hay mal olor, sangre o signos de malestar en la vaca.**



## Cuidado umbilical



Sumerja el ombligo. El ombligo es una pajita bien abierta que se introduce directamente en la cavidad corporal. Use una solución de tintura de yodo al 7 % o un producto comercial específicamente desarrollado para el tratamiento del ombligo.

- Sumerja todo el cordón umbilical: una inmersión abundante, con la solución en contacto con el área alrededor del muñón, ayuda a desinfectar toda el área y también promueve el secado.
- Volver a sumergir después de la alimentación con calostro: será imposible sumergir demasiado el ombligo en condiciones de producción.
- Volver a bañar el ombligo después de 18-24 horas: Este paso es especialmente importante para los terneros que se envían a otras instalaciones. Volver a bañar el ombligo en este momento reduce la carga de patógenos después del transporte.


## Manejo adecuado

No hace falta decir que todos los recién nacidos deben ser tratados con delicadeza.

Todavía vemos a los cuidadores frustrarse con los terneros. Un ternero Holstein de 43 kg, mojado y retorcido, puede ser un reto. Pero tener la mentalidad

correcta de que este animal tiene solo unos minutos de vida debería ser suficiente para que reduzcamos la velocidad, nos movamos despacio y lo tratemos con cuidado.

La evidente alegría en el rostro de este cuidador demuestra la actitud correcta hacia esta nueva vida. Igualmente importante, observe cómo ha levantado al ternero. Tiene los brazos delante del pecho y detrás de las patas traseras. Al levantarlos con el brazo debajo del vientre, existe mayor probabilidad de dañar la pared intestinal, lo que puede provocar una hernia .



## La importancia del calostro



Ya sea con biberón o sonda esofágica:

El calostro debe administrarse dentro de las primeras 6 horas de vida del ternero y administrarse a una tasa del 10% del peso corporal. Por lo general, 4 cuartos de galón para razas más grandes, como las razas Holstein y Beef, y 3 cuartos de galón para razas más pequeñas.

Un ternero depende del calostro para su inmunidad, ya que no desarrolla su propia inmunidad hasta que transcurren 5 o 6 semanas.



terry@dairyworks.com  
209-380-2803



# DairyWorks®

DairyWorks es una empresa independiente, ¡nuestro equipo está interesado en hacer que las evaluaciones, la documentación y la capacitación de los empleados sean lo más simples y agilizadas posible!

## Capacitación anual Requisitos para

La finalización de esta formación puede ser utilizada para:  
**Requisito de capacitación anual**

## Productos lácteos

Nombre del producto lácteo: \_\_\_\_\_

- Pre-

Destetado

## Cuidado de los terneros

- No-Ambulatorio  
Cuidado
- Determinar Aptitud para Transporte
- Eutanasia
- Manejo de ganado y Manejo de ganado
- Cuidado de las vacas

Acuerdos